



Investigating the Effect of Rhythmic Breathing Training by Teach Back Method on Anxiety in Patients Undergoing Tympanoplasty

Fatemah Barari¹, Mohsen Mollahadi², Zahra Moshtagh³, Mohammad Mehdi Salaree^{*4}

¹ Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

² Exercise physiology research center.life style institue and Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

³ School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University of Medical Sciences, , Tehran, Iran

⁴ Health Research Center, life style institute, Nursing faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

**Corresponding author: Mohammad Mehdi Salaree, Health Research Center, life style institute, Nursing faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran, email: mmsalaree@gmail.com*

Article Info

Keywords: Anxiety, Tympanoplasty, Rhythmic Breathing, Surgery, teach back method training

Abstract

Introduction: Rhythmic breathing exercises with the purpose of reducing anxiety and controlling patients' physiological characteristics can increase their ability to cope with illness. The purpose of this study was to perform rhythmic breathing exercises in response to the reduction of anxiety in patients undergoing tympanoplasty surgery.

Methods: This semi-experimental study was a group work that was conducted in 2018 in one of the medical centers in Tehran. The study population included all patients undergoing tympanoplasty surgery. Samples of the study were selected by simple random sampling method according to the criteria of entry among patients who were candidates for tympanoplasty surgery. Rhythmic breathing training was selected in two situations (The night before the operation in the ward and the morning of the operation in the operating room) and patients' anxiety levels were measured twice (before and after surgery)

Results: Based on the findings of this study, the mean age of the studied cases was 43.16 with a standard deviation of 12.16. Most of the cases were women (60.4%) and the level of education was high school graduates and higher (79.2%). The results also showed that patients' anxiety before and after rhythmic respiration decreased in the two positions of the inpatient ward and operating room and the difference was significant ($P < 0.05$).

Conclusion: Rhythmic respiration method as a non-invasive, safe, easy and cheap intervention can be used to reduce the anxiety of patients undergoing surgery, tympanoplasty surgery. Therefore, the use of this method is recommended for nurses to improve the health of patients.

بررسی تاثیرآموزش تنفس ریتمیک به شیوه بازخورده بر اضطراب بیماران تحت عمل جراحی تمپانوپلاستی

فاطمه باری^۱، محسن ملاهادی^۲، زهرا مشتاق^۳، محمد مهدی سالاری^{۴*}

^۱ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

^۲ مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، انسیتو سبک زندگی، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

^۳ دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران

^۴ مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، انسیتو سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

*نویسنده مسؤول: محمد مهدی سالاری، مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، انسیتو سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
ایمیل: mmsalaree@gmail.com

چکیده

مقدمه: تمرین تنفس ریتمیک با هدف کاهش اضطراب و کنترل شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران می‌تواند موجب افزایش توانایی آنها در مقابله با بیماری‌ها باشد. این مطالعه با هدف تمرین تنفسی ریتمیک به شیوه بازخورده بر کاهش اضطراب بیماران تحت عمل جراحی تمپانوپلاستی انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع نیمه‌تجربی، یک گروهی است که در سال ۱۳۹۷ در یکی از مرکز درمانی شهر تهران انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران تحت عمل جراحی تمپانوپلاستی بودند. نمونه‌های واحدهای مورد پژوهش به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با توجه به معیار ورود از بین بیمارانی که کاندید جراحی تمپانوپلاستی بودند؛ انتخاب شدند و آموزش تمرین تنفس ریتمیک در دو موقعیت (شب قبل از عمل در بخش و صبح روز عمل در اتاق عمل) و سطح اضطراب بیماران نیز دردو نوبت (قبل و بعد از جراحی) اندازه گیری شد.

یافته‌ها: براساس یافته‌های این پژوهش میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش ۴۳/۱۶ با انحراف معیار ۱۲/۱۶ بود. اکثر واحدهای مورد پژوهش (۶۰/۴ درصد) زن و سطح تحصیلات افراد دیپلم و بالاتر بود (۷۹/۲ درصد). همچنین نتایج نشان داد که میزان اضطراب بیماران قبل و بعد از اجرای تنفس ریتمیک در دو موقعیت بخش بستره و اتاق عمل کاهش و تفاوت معنی داری داشت ($P<0.05$).

نتیجه‌گیری: روش تنفس ریتمیک به عنوان یک مداخله غیرتهاجمی، ایمن، آسان و ارزان می‌تواند جهت ارتقاء سلامت بیماران تحت عمل جراحی تمپانوپلاستی مورد استفاده قرار گیرد. لذا استفاده از این روش به پرستاران جهت ارتقاء سلامت بیماران توصیه می‌شود.

وازگان کلیدی: اضطراب، تمپانوپلاستی، تنفس ریتمیک، جراحی، آموزش بازخورده

الگوی تنفس خود و آموزش تنفس‌ریتمیک، شدت درد را کاهش دهنده(۱۶).

امروزه آشنایی و آموزش برنامه‌های مراقبت و سلامت در سیستم‌های پژوهشی و بهداشتی هدف اساسی و بهترین روش برای پاسخگویی به نیازهای بیماران می‌باشد(۱۷). فرایند آموزش موثر بیمار بر پایه تعامل و ارتباط رضایت‌بخش فراهم کننده‌های مراقبتهای بهداشتی و بیمار استوار است. پایه اصلی هر فعالیت آموزشی نیز ارتباط موثر با بیمار است(۱۸). آموزش به روش باز خوردی(Teach back) به عنوان بهترین عمل به منظور ارتقا داشت بیماران و اصلاح مراقبت از خود قلمداد می‌شود(۱۹) آموزش به روش بازخوردی یک روش بررسی درک، بعد از آموزش بصورت پرسش از موارد شنیده شده و درک شده می‌باشد(۲۰) هدف از این روش آموزش، ارزیابی اثر بخشی آموزش در توانایی انتقال مفاهیم به یادگیرنده است(۲۱). در این روش درک ناصحیح بیمار از مطالب گفته شده به سرعت اصلاح شده و سوء تفاهم‌ها از بین می‌رود(۲۲). آموزش به روش باز خوردی به منظور افزایش درک و حفظ اطلاعات بیماران انجام می‌شود(۲۳) . فرد آموزش دهنده مطالب را با زبان ساده و قابل فهم بدون استفاده از اصطلاحات خاص پژوهشی به مددجو آموزش می‌دهد و بعد از پایان آموزش از مددجو می‌خواهد مطالب را آنگونه که درک کرده است با زبان خودش بازگو نماید. در صورتیکه مددجو مطالب را به خوبی درک نکرده باشد فرد آموزش دهنده تا درک کامل مطالب برای مددجو مطلب را تکرار می‌نماید(۲۴). طی سال‌های اخیر مطالعات زیادی در مورد تاثیر هر یک از روش‌های غیر دارویی بر شدت اضطراب بیماران مختلف صورت گرفته و استفاده از این روش‌ها را مورد حمایت قرار داده است. این مطالعه با هدف تاثیر آموزش تنفس‌ریتمیک به شیوه بازخوردی بر اضطراب بیماران بستری تحت عمل جراحی تمپانوپلاستی انجام شد.

روش‌ها

این مطالعه از نوع نیمه تجربی، یک گروهی است که به منظور تعیین تأثیر آموزش تنفس‌ریتمیک به شیوه بازخوردی بر اضطراب بیماران تحت عمل جراحی تمپانوپلاستی انجام گردید. جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران بستری در بخش‌های درمانی که کاندید عمل جراحی تمپانوپلاستی بودند را تشکیل دادند. تعداد ۴۸ بیمار کاندید عمل جراحی به روش نمونه‌گیری تصادفی از بین بیمارانی که با تشخیص جراحی تمپانوپلاستی بستری و وجود معیارهای ورود به مطالعه بودند(سن بین ۱۵-۶۵ سال، عدم مصرف داروهای ضد اضطراب در زمان بستری، حداقل سواد خواندن و نوشتن، عدم ناتوانی ذهنی شناخته شده و عدم سابقه جراحی ناحیه قفسه سینه و یا استرنوم) انتخاب شدند. برنامه آموزش تنفس

پارگی پرده گوش یکی از علل شایع منجر به ترشح مزمن از گوش، وزوز گوش، درد گوش و کاهش شنوایی می‌باشد که با ترمیم پرده گوش بسیاری از این علائم در بیمار متوقف و یا کاهش می‌یابد(۱،۲). پارگی پرده گوش اندیکاسیون قطعی جراحی نمی‌باشد و می‌توان یک پرده گوش با سوراخ مرکزی کوچک و خشک که کاهش شنوایی و عفونت قابل توجهی ندارد را به حال خود رها کرد. با این حال بیماران علیرغم کاهش شنوایی مختص، برای جلوگیری از آنوره و عفونت به دنبال مواجهه با آب یا استفاده از سمعک، خواهان انجام تمپانوپلاستی می‌باشند(۳).

بیماران مبتلا به اویتیت مزمن که از تخریب گوش و از دست دادن شنوایی رنج می‌برند، شامل درصد زیادی از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه‌های تخصصی گوش و حلق و بینی می‌شود(۴). اضطراب قبل از عمل یکی از مهمترین مشکلات بیماران است(۵). زیرا با افزایش نوسانات اتونومیک و افزایش نیاز به بیهوشی، افزایش بروز تهوع و استفراغ و افزایش درد در دوره پس از عمل ارتباط مستقیم دارد. در نتیجه این عوارض، دوره بیهوشی و طول اقامت در بیمارستان افزایش می‌یابد. علت دقیق اضطراب می‌تواند به علت بیهوشی، جراحی و چندین دلیل دیگر باشد(۶)

عدم کاهش اضطراب در بیماران، عوارض جسمی و روانی متعددی به صورت مزمن آنها را تهدید می‌کند(۵)، چرا که به دلیل سطح بالای اضطراب در آنها از همکاری و پذیرش درمان خود، امتناع می‌ورزند(۷). از سوی دیگر عدم پذیرش درمان باعث افزایش مدت اقامت در بیمارستان، بروز عفونت‌های بیمارستانی در این بیماران و تحمل هزینه‌های سنگینی بر بهداشت و درمان جامعه می‌گردد(۸)

پرستاران در مقایسه با سایر اعضای تیم مراقبت‌های بهداشتی نزدیکترین ارتباط را با بیماران دارند. به همین دلیل است که رفتار کارکنان پرستاری به خصوص در فرایند جراحی، تاثیر بیشتری بر احساسات اضطراب و ترس بیماران خواهد داشت(۹). از جمله روش‌های رایج کاهنده اضطراب غیر دارویی می‌توان به ماساژ درمانی(Massage Therapy)، ورزش، شناخت درمانی(Cognitive Therapy)، آرام‌سازی عضلانی(Relaxation)، موسیقی درمانی، رایحه درمانی(Aroma Therapy) و تنفس‌ریتمیک اشاره کرد(۱۰، ۱۱). این روش‌ها ضمن نداشتن هزینه و عملی بودن و غیر تهاجمی بودن، عوارضی برای بیماران نداشته و فواید بسیاری دارند(۱۲، ۱۳). تنفس‌ریتمیک یک روش ساده، کم هزینه و غیر تهاجمی است که توسط پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به درد استفاده می‌شود(۱۴) در زمان درد یا استرس، فرد تنفس‌های سریع و کم عمق دارد، این الگوی منفی تنفس با افزایش تنفس، پاسخ به درد را تداوم می‌بخشد(۱۵). پرستاران می‌توانند با راهنمایی بیماران در مورد کنترل فعل

بنابراین هر چه نمره‌ی فرد بالاتر باشد، اضطراب شدیدتر است(۲۴، ۲۵). این پرسشنامه در داخل کشور به طور مکرر توسط نادری و همکاران مورد استفاده قرار گرفته و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است(۲۶). در پژوهش حاضر نیز مجدداً پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با شرکت بیست نفر از بیماران بستری در بیمارستان انجام گرفت که مقدار ضربه آلفای کرونباخ معادل ۸۷٪ درصد به دست آمد.

نتایج

یافته‌های مطالعه بیانگر نشان داد که میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش $43/16$ و انحراف معیار سنی $12/16$ می‌باشد. اکثر واحدهای مورد پژوهش، زن بودند($60/4$ درصد) که 45 درصد آنان خانه‌دار بودند. اکثر واحدهای مورد پژوهش در این مطالعه دارای سطح تحصیلات دبیلم یا بالاتر بوده‌اند($39/6$ درصد). (جدول-۱)

ریتمیک ابتدا توسط پژوهشگر عصر روز قبل از عمل به شیوه اموزش بازخورده برای بیمار اجراء و تایادگیری کامل برای انجام آن ادامه یافت. سپس از بیمار خواسته شد تا تمرين تنفسی را هم شب قبل از عمل و هم صبح روز عمل زمانی که به بخش اتاق عمل فراخوان می‌شود در سالن انتظار انجام دهد. به منظور ارزیابی اضطراب بیمار و تاثیر آموزش تنفس ریتمیک به شیوه بازخورده در دو موقعیت(شب قبل از عمل در بخش و روز عمل در اتاق عمل) اضطراب بیمار اندازه‌گیری شد.

جهت اندازه‌گیری میزان اضطراب، از فرم کوتاه ۷ سوالی مقیاس اضطراب درد اسپیل برگ استفاده شد که سوالات به صورت: ۱) احساس آرامش می‌کنم، ۲) احساس می‌کنم سرحال هستم، ۳) احساس می‌کنم هول شده‌ام، ۴) احساس راحتی می‌کنم، ۵) احساس می‌کنم عصبی هستم، ۶) نگران هستم، ۷) احساس می‌کنم خشنود هستم، بوده و طریقه نمره‌گذاری آن به شکل خیلی کم(۱)، کم(۲)، متوسط(۳)، زیاد(۴)، خیلی زیاد(۵) است و برای آیتم‌های ۱، ۲، ۴ و ۷ نمره گذاری معکوس می‌باشد.

جدول ۱. توزیع فراوانی مطلق و نسبی برخی از مشخصات جمعیت شناختی واحدهای مورد پژوهش

| متغیر | تعداد(%) | فراوانی |
|---------|-----------|-----------------|
| جنس | ۱۹ (۳۹/۶) | مرد |
| جنس | ۲۹ (۶۰/۴) | زن |
| تحصیلات | ۱۰ (۲۰/۸) | زیر دبیلم |
| تحصیلات | ۱۹ (۳۹/۶) | دبیلم |
| وزن | ۱۹ (۳۹/۶) | بالاتر از دبیلم |

جدول ۲. میانگین و انحراف معیار برخی از مشخصات جمعیت شناختی واحدهای مورد پژوهش

| متغیر | شاخص | | حداقل | حداصل | حداکثر | میانگین | انحراف معیار |
|-------|------|-----|-------|-------|--------|---------|--------------|
| سن | | ۶۲ | ۲۲ | | ۲۲ | ۴۳/۱۶ | ۱۲/۱۶ |
| قد | | ۱۸۴ | ۱۴۸ | | ۱۴۸ | ۱۶۵/۶۶ | ۹/۳۰ |
| وزن | | ۹۰ | ۵۲ | | ۵۲ | ۷۱/۲۵ | ۸/۸۰ |

جدول ۳. میانگین و انحراف معیار نمرات اضطراب واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله در دو موقعیت

| اضطراب | زمان مداخله | بخش بستری | بعد از مداخله | قبل از مداخله | اتاق عمل | بعد از مداخله | قبل از مداخله |
|----------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| حداصل | | | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
| حداکثر | | | ۳۱ | ۳۱ | ۳۳ | ۳۳ | ۲۳ |
| میانگین | | | ۱۷/۱ | ۱۴/۳ | ۱۹/۱ | ۱۹/۱ | ۱۵/۷ |
| انحراف معیار | | | ۵/۷ | ۴/۳ | ۶/۱ | ۶/۱ | ۳/۶ |
| آزمون آماری و سطح معناداری | | | P=0.001 | P=0.001 | P=0.000 | P=0.000 | |

معیار سنی $12/16$ می‌باشد. اکثر واحدهای مورد پژوهش، زن بودند($60/4$ درصد) که 45 درصد بیماران خانه‌دار بودند. اکثر واحدهای مورد پژوهش در این مطالعه دارای سطح تحصیلات دبیلم یا بالاتر بوده‌اند($39/6$ درصد). بدین ترتیب این امر موجب تسهیل یادگیری و درک عمیق تر مطالب آموزشی می‌شد اگرچه

بحث

مطالعه حاضر با هدف "تعیین تاثیر آموزش تنفس ریتمیک به شیوه بازخورده قبل از بیهوشی بر اضطراب بیماران تحت عمل جراحی تمپانوپلاستی در"، انجام شد. یافته‌ها بیانگر این مطلب است که میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش $43/16$ و انحراف

بیماران تحت همودیالیز در روش معمول و پس از انجام مداخله تنفس‌ریتمیک اختلاف معنا داری وجود داشت که این مسئله با یافته‌های این پژوهش مطابقت داشت (۱۵).

نتایج مطالعه باقیران و همکاران با عنوان تأثیرات تمرين تنفس منظم و جباب سازی بر درد ناشی از رگ‌گیری در کودکان سن مدرسه در سال ۱۳۹۱ نشان داد تفاوت آماری معناداری در میانگین شدت درد در گروه شاهد و گروه آزمون بعد از تزریق وجود دارد و هر دو روش انحراف فکر درد ناشی از رگ‌گیری را کاهش داده است (۳۰).

فرزین آرا و همکاران در مطالعه خود با عنوان مقایسه تأثیر ذکرالله و تنفس ریتمیک بر درد بعد از عمل در بیماران تحت جراحی ارتپیدی، نشان دادند که هر دو روش ذکرالله و تنفس ریتمیک بر کاهش میزان درد مؤثرند و می‌توان از هر دو روش جهت کاهش درد پس از عمل جراحی ارتپیدی استفاده کرد. اما کاهش درد در گروه تنفس ریتمیک بیشتر بود (۳۱). مطالعه حاضر با مطالعه فرزین آرا از این بابت مشابهت دارد.

نتیجه گیری

با توجه به اهمیت آموزش صحیح در مراقبت‌های بالینی و مراقبت از بیماران، نحوه ارائه آموزش و تطابق آن با سن، جنس و درجه تحصیلات آنها، اهمیتی دوچندان دارد. نتایج مطالعه حاضر و مطالعه مشابه نشان داد که آموزش صحیح در این امر از اهمیت بخورداد است. از طرفی آموزش تنفس ریتمیک نیز، از تکنیک‌هایی است که منجر به کاهش سطح اضطراب و حتی درد بیماران بعد از اعمال جراحی شده است، لذا هم آموزش به روش بازخوردی و هم روش تنفس ریتمیک برای کاهش اضطراب و درد بیماران توصیه می‌شود. به عنوان پیشنهاد برای پژوهش‌های بعدی، انجام مطالعه بر روی دو گروه که در یک گروه از روش آموزش بازخوردی و در گروه دیگر از روش‌های مشابه برای آموزش استفاده شود، پیشنهاد می‌گردد.

ملاحظات اخلاقی

رضایت آگاهانه از تمامی شرکت کنندگان دریافت و به همه آنها اطمینان داده شد که اطلاعات محترمانه خواهد ماند. کد اخلاق پژوهش حاضر IRIAU.TMU.REC.1397.122 است.

تضاد منافع

نویسنده‌گان هیچ گونه تضاد منافعی ندارند.

سپاسگزاری

در افرادی که سطح سواد زیر دیلم داشتند، نیز این احتمال وجود داشته است که با انگیزه بوده و فواید انجام تنفس‌ریتمیک را درک نموده و همکاری نمایند. در توافق با این یافته‌ها، در مطالعه باقیری و همکاران (۲۰۱۸) اکثریت واحدهای پژوهش دارای تحصیلات زیر دیلم بوده‌اند که این امر احتمالاً به دلیل تفاوت در محیط پژوهش این مطالعه بوده است. همچنین ۵۴/۲ درصد از بیماران در شهرستان سکونت داشته‌اند و نیز اکثریت واحدهای مورد مطالعه سابقه حساسیت و بیماری روحی روانی نداشته‌اند (۱۷).

یافته‌های پژوهش در زمینه‌ی سایر عوامل جمعیت شناختی نشان داد که ۸۳/۳ درصد از بیماران سابقه‌ی بستری و عمل جراحی را داشتند که از این تعداد ۶۰/۴ درصد جراحی سر و گردن را تجربه کردند با توجه به این که اکثر شرکت کنندگان بیماری زمینه‌ای نداشتند (۶۸/۸ درصد). همچنین میانگین سنی افراد ۴۳/۱۶ و دارا بوده‌اند (۱۴/۶۰ درصد). همچنین میانگین سی افراد ۱۶۵/۶۶ و حداکثر وزن بیماران ۹۰ و حداقل وزن ۵۲ کیلوگرم بوده است.

در این مطالعه متوسط میزان اضطراب بیماران در بخش قبل از مداخله ۱۷/۱ و بعد از مداخله ۱۴/۳ ($p=0.001$) و در اتاق عمل قبل از مداخله ۱۹/۱ و بعد از مداخله ۱۵/۷ ($p=0.000$) بوده است که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری با یکدیگر داشته اند. این امر نشان دهنده کاهش قابل توجه میزان اضطراب بیماران بوده و گویای موثر بودن روش تنفس‌ریتمیک بر میزان اضطراب بیماران بستری بود. با توجه به تجزیه و تحلیل‌های انجام شده و نتایج بدست آمده از آزمون آماری پارامتریک (کوواریانس) تنها متغیر موثر بر میزان اضطراب تنفس‌ریتمیک بود. با توجه به مطالعه موندا و همکاران که در سال ۲۰۱۹ انجام شده به این نتیجه رسیدند که بیماران قبل از عمل جراحی سطح اضطراب بالایی دارند و در این میان اضطراب در زنان بیشتر از مردان مشاهده شده است که این رویداد (سطح بالای اضطراب) با یافته‌های پژوهش حاضر مطابقت دارد (۲۷).

در مطالعه‌ای که رهدار و همکاران در سال ۲۰۱۸ تاثیر تنفس ریتمیک بر فشارخون انجام دادند به این نتیجه دست یافته‌ند که تنفس‌ریتمیک یکی از راههای مقابله با استرس و فشارخون بالا می‌باشد بدین صورت فشارخون سیستولیک و دیاستولیک کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت که با نتایج حاصل از مطالعات این پژوهش مطابقت دارد (۲۸). مطالعه بزرگ‌نژاد و همکاران در سال ۲۰۱۸ حاکی از آن است که روش‌های آرامسازی و از جمله تکنیک تنفس‌ریتمیک می‌تواند نقش مهمی در یادگیری و اجرای مهارت مدیریت درد داشته باشد. بدین جهت توصیه شده که اکثر پرستاران تکنیک تنفس‌ریتمیک را فرا گرفته و به بیماران نیز آموزش دهند (۲۹).

مطالعه بروز و همکاران (سال ۱۳۹۱) نشان داد که بین میانگین شدت درد ناشی از وارد نمودن سوزن‌های عروقی در

در انتهای پژوهش حاضر از تمامی بیماران که در طرح حاضر همکاری داشتند و همچنین واحد پژوهش و پرسنل بخش‌های جراحی گوش-حلق و بینی تقدیر و تشکر می‌گردد.

منابع

1. Saliba I, Knapik M, Froehlich P, Abela A. Advantages of hyaluronic acid fat graft myringoplasty over fat graft myringoplasty. *Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery*. 2012;138(10):950-5.
2. Raghuvanshi SK, Asati DP. Outcome of single-sitting bilateral type 1 tympanoplasty in Indian patients. *Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery*. 2013;65(3):622-6.
3. Jeffery CC, Shillington C, Andrews C, Ho A. The palisade cartilage tympanoplasty technique: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Otolaryngology-Head & Neck Surgery*. 2017;46(1):48.
4. Naderpour M, Shahidi N, Hemmatjoo T. Comparison of tympanoplasty results in dry and wet ears. *Iranian journal of otorhinolaryngology*. 2016;28(86):209.
5. Jawaid M, Mushtaq A, Mukhtar S, Khan Z. Preoperative anxiety before elective surgery. *Neurosciences*. 2007;12(2):145-8.
6. Celik F, Edipoglu ISJEjomr. Evaluation of preoperative anxiety and fear of anesthesia using APAIS score. 2018;23(1):41.
7. Ananthakrishnan AN, Gainer VS, Cai T, Perez RG, Cheng S-C, Savova G, et al. Similar risk of depression and anxiety following surgery or hospitalization for Crohn's disease and ulcerative colitis. *The American journal of gastroenterology*. 2013;108(4):594.
8. Lee J-S, Park Y-M, Ha K-Y, Cho S-W, Bak G-H, Kim K-W. Preoperative anxiety about spinal surgery under general anesthesia. *European Spine Journal*. 2016;25(3):698-707.
9. Komolafe C, Csernus M, Fülöp E. Patients' anxiety during the perioperative care from the point of view of the nursing staff and patients. *Kontakt*. 2015;17(2):e80-e8.
10. Kochupillai V, Kumar P, Singh D, Aggarwal D, Bhardwaj N, Bhutani M, et al. Effect of rhythmic breathing (Sudarshan Kriya and Pranayam) on immune functions and tobacco addiction. *Annals of the New York Academy of Sciences*. 2005;1056(1):242-52.
11. Friedman AB, Gluth MB, Moore PC, Dornhoffer JL. Outcomes of cartilage tympanoplasty in the pediatric population. *Otolaryngology–Head and Neck Surgery*. 2013;148(2):297-301.
12. Malloy KM, Milling LS. The effectiveness of virtual reality distraction for pain reduction: a systematic review. *Clinical psychology review*. 2010;30(8):1011-8.
13. Sharma P, Thapliyal A, Chandra T, Singh S, Baduni H, Waheed SM. Rhythmic breathing: immunological, biochemical, and physiological effects on health. *Adv Mind Body Med*. 2015;29(1):18-25.
14. Kitko J. Rhythmic breathing as a nursing intervention. *Holistic nursing practice*. 2007;21(2):85-8.
15. Borzou SR, Akbari S, Falahinia G-H, Mahjub H. Effect of rhythmic breathing on pain intensity during insertion of vascular needles in hemodialysis patients. *Hayat*. 2014;19(4):6-14.
16. Park E, Oh H, Kim T. The effects of relaxation breathing on procedural pain and anxiety during burn care. *Burns*. 2013;39(6):1101-6.
17. Bagheri H, Ebrahimi H, Abbasi A, Atashsokhan G, Salmani Z, Zamani MJJoPN. Effect of Preoperative Visitation by Operating Room Staff on Preoperative Anxiety in Patients Receiving Elective Hernia Surgery. 2018.
18. Gruman J, Rovner MH, French ME, Jeffress D, Sofaer S, Shaller D, et al. From patient education to patient engagement: implications for the field of patient education. *Patient education and counseling*. 2010;78(3):350-6.
19. Dinh TTH, Bonner A, Clark R, Ramsbotham J, Hines S. The effectiveness of the teach-back method on adherence and self-management in health education for people with chronic disease: a systematic review. *JBI database of systematic reviews and implementation reports*. 2016;14(1):210-47.
20. Oshvandi K, Jokar M, Khatiban M, Keyani J, Yousefzadeh MR, Sultanian AR. The effect of self care education based on teach back method on promotion of self care behaviors in type ii diabetic patients: a clinical trial study. *Iranian journal of Diabetes and Metabolism*. 2014;13(2):131-43.
21. Oh EG, Lee HJ, Yang YL, Kim YM. Effectiveness of Discharge Education With the Teach-Back Method on 30-Day Readmission: A Systematic Review. *Journal of patient safety*. 2019.
22. Dinh TTH, Clark R, Bonner A, Hines S. The effectiveness of health education using the teach-back method on adherence and self-management in chronic disease: a systematic review protocol. *JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports*. 2013;11(10):30-41.
23. White M, Garbez R, Carroll M, Brinker E, Howie-Esquivel J. Is "teach-back" associated with knowledge retention and hospital readmission in hospitalized heart failure patients? *Journal of Cardiovascular Nursing*. 2013;28(2):137-46.

24. Julian LJ. Measures of anxiety: state-trait anxiety inventory (STAI), Beck anxiety inventory (BAI), and Hospital anxiety and Depression scale-anxiety (HADS-A). *Arthritis care & research*. 2011;63(S11):S467-S72.
25. Perpiñá-Galván J, Richart-Martínez M, Cabañero-Martínez MJ. Reliability and validity of a short version of the STAI anxiety measurement scale in respiratory patients. *Archivos de Bronconeumología ((English Edition))*. 2011;47(4):184-9.
26. Naderi F, Aghaei A, Mohammad-zadeh M, Nazemi S, Salmani F, Rashvand M. The Effects of music therapy on Pain Threshold, Anxiety, distress response and Hemodynamic Parameters during dressing changes in burn patients. *The Horizon of Medical Sciences*. 2014;20(1):63-8.
27. Mundu M, Toppo S, Bakhla AKJP-IJOR. PREOPERATIVE ANXIETY: MODE OF ANESTHESIA AND GENDER PERSPECTIVE. 2019;6.(1)
28. Rahdar M, Rahnama M, Shaykh G, Gholampour Z .Effect of Training Rhythmic Breathing on the Blood Pressure of Hypertensive Patients. 2018.
29. Bozorg-Nejad M, Azizkhani H, Ardebili FM, Mousavi SK, Manafi F, Hosseini AF. The Effect of Rhythmic Breathing on Pain of Dressing Change in Patients with Burns Referred to Ayatollah Mousavi Hospital. *World journal of plastic surgery*. 2018;7(1):51.
30. Bagheriany S, Borhani F, Abbaszadeh A, Ranjbar H. The effects of regular breathing exercise and making bubbles on the pain of catheter insertion in school age children. *Iranian journal of nursing and midwifery research*. 2011;16(2):174.
31. Comparative Study of the Effect of Allah's Recitation and Rhythmic Breathing on postoperative pain in Orthopedic Patients. *Anesthesiology and Pain*. 2018;9(1):68-78.